

ECOstyle™

100%
NATUURLIJK



**Heeft u last van bloedluis
in het kippenhok?**

Bestrijd effectief met natuurlijke vijanden
Roofmijt tegen bloedluis
bij gevogelte



Natuurlijke vijanden van de plaag: roofmijt. Bloedluizen hebben natuurlijke vijanden, zoals roofmijt. Zet u die goed in, dan bent u gauw van uw plaag af. Zonder schade voor de natuur, andere dieren of het milieu.

Wat zijn roofmijten?

De roofmijt is lichtbruin van kleur en ongeveer 1 mm groot. Van nature leeft hij in de bovenste centimeters van de bodem. De roofmijt gaat actief op zoek naar de bloedluis in diens schuilplaatsen. Dit zijn vaak de plekken waar ook de vogels zich graag nestelen zoals slaap- en nest- en eilegplaatsen.

Hoe werken roofmijten?

Een roofmijt leeft gemiddeld 6 weken en eet in deze periode enkele honderden bloedluizen (ongeveer 5 per dag). Het resultaat van de toepassing wordt na ongeveer twee weken zichtbaar. Om bloedluis goed te bestrijden dient u niet alleen de roofmijt goed in te zetten, maar ook het hok goed schoon te houden, naden en kieren af te kitten en te zorgen voor een goede hygiëne. Het kan zijn dat er in de eerste weken na het toepassen van de roofmijt meer bloedluizen worden waargenomen. Dit is een goed teken; de bloedluizen worden door de roofmijten uit hun schuilplaatsen verjaagd. De kippen hebben geen last van de roofmijten.

ECOstyle is de specialist op het gebied van Natuurlijke Vijanden. Al ruim 50 jaar is ECOstyle voorloper in natuurlijke producten voor tuin, huisdier en de professionele sector. Alle producten helpen de natuurlijke balans in bodem, plant of dier herstellen of behouden.

Neem voor vragen contact op: 0516 432 122 of consument@ecostyle.nl

Toepassingsperiode en temperatuur

De roofmijt gedijt het beste bij een luchtvochtigheid van zo'n 70% en bij temperaturen van 20 °C tot 30 °C. De roofmijt is al wel actief bij lagere temperaturen (ca. 10 °C) maar ontwikkelt zich dan langzamer. Pas vanaf 15 °C zijn de roofmijten ook daadwerkelijk actief. Belangrijk is dat de roofmijt vroegtijdig wordt ingezet, niet als de ziektedruk al hoog is.

Toepassingsperiode
april tot en met
september



Bloedluis



Roofmijt



Bloedluis in het kippenhok

Waar in te zetten?

In het kippenhok, de duiventil, vogelnesten of in de volière. Onze roofmijt is verpakt per 5.000 stuks voor 5 m² (grondoppervlak + oppervlak zijwanden) of 10.000 stuks voor 10 m² (grondoppervlak + oppervlak zijwanden). De roofmijten worden geleverd in een zakje met strooisel. In dit strooisel zitten de eitjes, nimfen en volwassen exemplaren van de roofmijt.

Hoe herkent u bloedluis bij gevogelte?

Bloedluis is, in tegenstelling tot wat zijn naam suggereert, geen luis maar een mijt. Bloedluis staat ook wel bekend als rode vogelmijt, kippenmijt of rode mijt. Bloedluis is een parasiet van vogels waaronder kippen, duiven, parkieten en kanaries. Het beestje is minder 1 millimeter groot en rood van kleur wanneer hij zich heeft volgezogen met bloed. Overdag houdt de bloedluis zich schuil in het kippenhok of in de volière; in kieren en spleten, onder zitstokken, onder legnesten of voerbakken en in het strooisel. 's Nachts komt de bloedluis uit zijn schuilplaats en voedt zich met het bloed van slapende kippen. Dit veroorzaakt stress, verenpikken, verminderde eetlust, roodheid en irritatie van de huid, bloedarmoede en verminderde eiproduktie. Een bloedluis leeft 1-2 maanden en kan in die periode wel 2.500 eitjes leggen. Bloedluizen kunnen zo – vooral in de zomer wanneer het warm en vochtig is – in korte tijd tot een enorme plaag uitgroeien. In 1 tot 2 weken tijd kan de hoeveelheid bloedluizen wel met 10 tot 100 keer vermenigvuldigen. Bloedluizen kunnen maandenlang zonder voedsel dus ook in een leeg hok kunnen deze parasieten gedijen.